

IS MY PET HAVING A VACCINE REACTION?

Please monitor your pet for the 24 hours after vaccination. It is not unusual for a pet to be quiet and uncomfortable for up to 24 hours after a vaccination. There may be localized pain, loss of appetite, and lethargy associated with shots. If these signs persist longer than 24 hours, take your pet to a veterinarian for examination.

There are also more severe signs that might indicate a vaccine reaction. These include nausea, vomiting, diarrhea, difficulty breathing, facial swelling, hives, and itchiness. These may appear almost immediately after the vaccinations are administered, or possibly hours after. Any of these signs may progress rapidly to a life-threatening allergic reaction. **If you notice ANY of these reactions, bring your pet to your veterinarian or to the closest emergency hospital as soon as possible.** Early treatment of these signs may prevent more significant problems from developing.

In rare occasions, a life-threatening allergic reaction may occur. In these cases, there may be breathing difficulties, collapse, staggering, seizures, and even death. **Immediate onset of diarrhea, vomiting, choking, or collapsing requires emergency evaluation at your veterinarian or at an emergency pet facility.**

If there are ANY questions about whether your pet is having an allergic reaction, it is advised that you see your normal veterinarian or an emergency pet facility immediately.

EMERGENCY VET CLINICS

Animal Emergency Clinic of Pasadena

2121 E. Foothil Blvd.
Pasadena, CA 91107
Phone: 626.578.1725

TLC Pet Medical Center

1412 Huntington Dr.
South Pasadena, CA 91030
Phone: 626.441.8555

Emergency Pet Clinic of San Gabriel Valley

3254 Santa Anita Ave.
El Monte, CA 91733
Phone: 626.579.4550

Animal Specialty Group

4641 Colorado Blvd.
Los Angeles, CA 90039
Phone: 818.244.7977



PASADENA HUMANE

361 S. Raymond Ave.
Pasadena, CA 91105
626.792.7151
pasadenahumane.org

¿ESTÁ MI MASCOTA TENIENDO UNA REACCIÓN A LA VACUNA?

Por favor vigile a su mascota por las 24 horas posteriores a la aplicación de la vacuna. No es inusual que su mascota esté calada e incómoda por 24 horas después de la vacunación. Por las vacunas, puede haber, dolor en el área afectada, pérdida de apetito y letargo. **Si estos síntomas persisten por más de 24 horas, lleve a su mascota con su veterinario para revisión.**

También existen otros síntomas más severos que pueden indicar una reacción más grave a la vacuna; estos incluyen náusea, vómito, diarrea, dificultad para respirar, hinchazón facial, urticaria y comezón. Estos síntomas pueden aparecer casi inmediatamente después de la aplicación de la vacuna o posiblemente horas después. Cualquiera de estos síntomas puede convertirse rápidamente en una reacción alérgica que puede llegar a ser mortal. **Si nota CUALQUIERA de estos síntomas, lleve a su mascota lo antes posible con su veterinario o al hospital de emergencias veterinarias más cercano.** Si los síntomas se atienden pronto, se puede prevenir el que surjan problemas más considerables.

En raras ocasiones, puede producirse una reacción alérgica potencialmente mortal. En estos casos, pudiera presentarse dificultad para respirar, desmayo, tambaleo, convulsiones e incluso la muerte. **El comienzo inmediato de diarrea, vómito, asfixia o desmayo requiere de una revisión de urgencia por su veterinario o en un centro de emergencia veterinaria.**

Si existe CUALQUIER duda de si su mascota está teniendo una reacción alérgica se recomienda que acuda inmediatamente a su veterinario habitual o a un centro de emergencia veterinaria.

CLÍNICAS DE EMERGENCIA VETERINARIA

Animal Emergency Clinic of Pasadena
2121 E. Foothill Blvd.
Pasadena, CA 91107
Teléfono: 626.578.1725

TLC Pet Medical Center
1412 Huntington Dr.
South Pasadena, CA 91030
Teléfono: 626.441.8555

Emergency Pet Clinic of San Gabriel Valley
3254 Santa Anita Ave.
El Monte, CA 91733
Teléfono: 626.579.4550

Animal Specialty Group
4641 Colorado Blvd.
Los Angeles, CA 90039
Teléfono: 818.244.7977